

## FRENTE

Para bovinos de corte  
Terminação

Uso Veterinário

**Contratack**<sup>®</sup>  
**PLUS** *Injetável*

Fluazuron 8,0%  
Eprinomectina 1,8%



### FÓRMULA:

Cada 100mL contém:

Fluazuron .....	8,0g
Eprinomectina .....	1,8g
Veículo q.s.p.....	100,0mL

### ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA.

#### BOVINOS:

**ABATE:** O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 17 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO;

**LEITE:** ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

#### INDICAÇÕES:

**CONTRATACK INJETÁVEL PLUS** é um endectocida associado a inibidor do crescimento de carrapatos, indicado para o controle de parasitas externos e internos dos bovinos, sensíveis aos princípios ativos do produto, tais como: **carrapatos** (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*) e **moscas-dos-chifres** (*Haematobia irritans*). **Nematódeos (vermes) gastrintestinais adultos e larvas de 4º estágio:** *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Ostertagia ostertagi* e *Cooperia punctata*.

#### POSOLOGIA:

**CONTRATACK INJETÁVEL PLUS** apresenta-se pronto para uso. Administrar exclusivamente pela via subcutânea, na dose de 1600µg/kg de peso vivo de fluazuron e 360µg/kg de peso vivo de eprinomectina, ou seja, 1mL para cada 50kg de peso vivo. Aplicar sob a pele solta, atrás ou na frente da escápula (paleta), utilizando uma agulha de calibre 18, de 15 a 20mm de comprimento.

#### PRECAUÇÕES:

**MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

- Usar equipamento estéril e seguir as normas de assepsia durante o manuseio e aplicação do produto.

## VERSO

- Não fumar ou se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Lavar bem as mãos após o manuseio do produto.
- Não guardar ou aplicar o produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não administrar por via intramuscular ou intravenosa.
- Aplicar somente em bovinos.

#### SEGURANÇA:

**CONTRATACK INJETÁVEL PLUS** possui ampla margem de segurança e pode ser administrado em animais jovens, vacas prenhes e em touros na idade reprodutiva. Não foram observadas reações adversas, mesmo quando o produto foi administrado em até três vezes a dose recomendada.

#### SEGURANÇA AMBIENTAL:

- Não descartar o produto em mananciais de água como rios, lagos e represas.
- Limpar os equipamentos utilizados na aplicação do produto de maneira a evitar contaminação ambiental.
- Recomenda-se descartar as embalagens em aterro industrial ou encaminhar para incineração.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.

#### GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Benzoilfenilureia (fluazuron) e avermectina (eprinomectina).

#### CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C. Uma vez aberto e perfurado a rolha, o produto poderá ser utilizado em até 3 (três) meses.

**ATENÇÃO:** Este medicamento não é para uso humano.

#### FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

**VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.**

Rua 11, S/N, Qd. 07 Lt. 04, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO - CEP: 74.985-128.

CNPJ/MF: 60.528.742/0003-88.

[www.vetoquinol.com.br](http://www.vetoquinol.com.br) | [faleconosco@vetoquinol.com](mailto:faleconosco@vetoquinol.com)

**SAC: 0800 741 1005**

#### Responsável Técnica:

Renata C. F. Soares - CRF/GO nº 4.046.

Licenciado pelo MAPA desde 15/04/2015.

Registrado sob o nº GO 001170-3.000009

**Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:**

**Vide rótulo do frasco.**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB  
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO.**

INDÚSTRIA BRASILEIRA

