

FRENTE



Bovinos

Flytion[®]

EC 50

Uso Veterinário

**Carrapaticida, Mosquicida e Bernicida
para Pulverização em Bovinos.**

FÓRMULA:
Cada 100mL contém:
Clorpirifós 50,0g
Cipermetrina high-cis 6,0g
Veículo q.s.p 100,0mL

**ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE
PERÍODO DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS
SOMENTE DEVE SER REALIZADO 39 DIAS APÓS A
ÚLTIMA APLICAÇÃO; LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS
TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 5 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

INDICAÇÕES:
FLYTION EC 50 é indicado para controle do carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, berne (*Dermatobia hominis*) e mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) em bovinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USO E DOSAGENS:
USO EXTERNO. FLYTION EC 50 deverá ser aplicado com auxílio de pulverizador e de acordo com a diluição em água descrita na tabela abaixo:

Quantidade de água	Carrapatos e bernes	Somente mosca-dos-chifres
20 litros	33 mL	17 mL
40 litros	66 mL	33 mL
600 litros	1 litro	500 mL
1200 litros	2 litros	1 litro

Recomenda-se no mínimo 3 litros de calda por animal ou conforme a indicação do médico-veterinário.

RECOMENDAÇÕES:
• **MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
• Não tratar os animais durante as horas de sol intenso.
• Não tratar animais recém-nascidos, debilitados, exaustos e sedentos.
• Não aplicar FLYTION EC 50 contra o vento.

VERSO

- Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar equipamentos individuais de proteção tais como: luvas, botas, avental, macacão e outros, durante a manipulação e aplicação do produto.
- Não guardar ou aplicar FLYTION EC 50 junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não utilizar FLYTION EC 50 associado a outros organofosforados.
- Não diluir o produto em óleos para aplicação pour-on.
- Não utilizar FLYTION EC 50 em botes pulverizadores fechados.
- Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.
- Utilizar o produto no máximo 24 horas após sua diluição em água.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Não dar de beber substâncias gordurosas ou leite em casos de acidente.
- Em caso de acidente procurar imediatamente assistência médica.

ACIDENTES EM HUMANOS:

Acidente tóxico: retirar as roupas atingidas e lavar a pele com bastante água corrente e sabão.

Acidente ocular: lavar os olhos com bastante água corrente, durante no mínimo 15 minutos.

Ingestão acidental: levar a pessoa a um local ventilado. Recomenda-se não provocar vômito. Procurar um médico imediatamente, levando consigo a embalagem do produto.

ANTÍDOTO: Tratamento sintomático mais sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Contrathion). Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Organofosforado e piretróide.

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua 11, S/N, Qd. 07, Lt. 04, Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CEP: 74.985-128.

CNPJ/MF: 60.528.742/0003-88.

www.vetoquinol.com.br

faleconosco@vetoquinol.com

SAC: 0800 741 1005

Responsável Técnica:

Renata C. F. Soares. - CRF/GO nº 4.046.

Licenciado pelo MAPA desde 27/06/2002.

Registrado sob o nº GO 001170-3.000036.

Nº da partida / Data da fabricação / Data do vencimento:

Vide rótulo do frasco.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO-VETERINÁRIO**



INDÚSTRIA BRASILEIRA

