



Uso Veterinário



FÓRMULA:

Cada 100mL contém:
Clorpirifós 2,5g
Cipermetrina high-cis 5,0g
Butóxido de piperonila 1,0g
Veículo q.s.p 100,0mL

ATENÇÃO: OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA
BOVINOS
ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 10 DIAS
APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER
DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 3 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA
PRODUTO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE
CONTRARRÓTULO PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS
LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O
CONSUMO.

INDICAÇÕES:

FLYTION POUR-ON é indicado para o controle da mosca-dos-chifres (*Haematobia irritans*) e auxiliar no controle do carrapato *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* e do berne (*Dermatobia hominis*) em bovinos.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: USO EXTERNO.

MODO DE USAR E DOSAGENS:

FLYTION POUR-ON deve ser aplicado na região dorsal, da nuca até a garupa com auxílio da pistola dosadora.
Mosca-dos-chifres, carrapatos e bernes: 1mL para 10kg de peso vivo até o volume máximo de 40mL por animal.
Somente mosca-dos-chifres: 10mL por animal independente do peso vivo.

PRECAUÇÕES E RECOMENDAÇÕES:

MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não tratar os animais durante as horas de sol intenso.

Não tratar animais recém-nascidos, debilitados, exaustos e sedentos.

Proteger a pele e os olhos, durante o manuseio e aplicação do produto.
Em caso de acidentes, tirar a roupa atingida pelo produto e lavar as partes do corpo atingidas com bastante água corrente e sabão.
Utilizar equipamentos de proteção individual ao manipular o produto.

Não guardar ou aplicar **FLYTION POUR-ON** junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.

Não utilizar **FLYTION POUR-ON** associado a outros produtos organofosforados.

Não diluir o produto em óleos para aplicação pour-on.

Descartar as embalagens vazias de forma segura e evitando a contaminação do meio ambiente.

Produto tóxico para peixes, pássaros e abelhas.

Não beber, comer ou fumar durante a manipulação do produto ou tratamento dos animais.

Não dar de beber substâncias gordurosas ou leite em caso de acidente.

Em caso de acidente procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.

MANTER DISTANTE DO CALOR, CHAMAS E OUTRAS FONTES DE FAÍSCAS.

NÃO UTILIZAR O PRODUTO DURANTE MARCAÇÕES E MOCHAÇÕES A FOGO.

ANTÍDOTO: Tratamento sintomático mais sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM ou Contrathion). Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS: Organofosforado e piretróide.

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor e em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C.

PART.: 24,5mm
FABR.: ÁREA
VENC.: SEM VERNIZ

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

CLARION BIOCIÊNCIAS LTDA.
R. 4, S/N, Qd. 07, Lt. 47-55, Polo Empresarial Goiás.
Aparecida de Goiânia/GO - CNPJ/MF 03.244.722/0004-22.
www.vetoquinol.com.br
SAC: 0800 741 1005

Resp. Técnico:
Gladstone Santos de Souza, PhD - CRMV/GO nº 1.863.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.274 em 27/06/2002.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

CÓD. BARRAS
EAN 13
789 822126 020 3

20027409



CUIDADO
VENENO

EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE:
CCI: 0800 7713733 - 24 HORAS.