

Uso Veterinário

USO VETERINÁRIO

FRONTMAX[®]

COLEIRA

FÓRMULA:

Cada 100g contém:

Fipronil.	4,0 g
Piriproxifeno	4,0 g
Permetrina	8,5 g
Excipiente q.s.p.	100,0 g

INDICAÇÕES:

FRONTMAX COLEIRA é indicado para cães e possui eficácia carrapaticida contra o carrapato *Rhipicephalus sanguineus* e eficácia pulicida contra a pulga *Ctenocephalides felis felis* por até 8 meses, após colocada no pescoço do animal. O produto também possui ação inseticida contra o flebotômíneo vetor da leishmaniose (*Lutzomyia longipalpis*), com eficácia de repelência superior a 95%.

MODO DE USO:

Retire a coleira de sua embalagem. Desenrole-a e retire todos os conectores plásticos da face interna antes de colocá-la no animal. Coloque a coleira no pescoço do animal, de forma justa, sem apertar deixando um espaço de dois dedos entre a coleira e o pescoço do animal e afivele. Corte o excedente da ponta da coleira caso ultrapasse 2 cm.

ATENÇÃO: Checar periodicamente a coleira e ajustar caso necessário.

FRONTMAX COLEIRA deve ser utilizada continuamente, devendo ser retirada após 8 meses ou quando apresentar sinais de retorno das infestações. **FRONTMAX COLEIRA** é resistente a água e permanece eficaz mesmo se o animal for banhado com a coleira.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

- **Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.**
- Manter o produto na embalagem original.
- Não utilizar a embalagem vazia.
- Descartar a embalagem e restos do produto de forma segura evitando a contaminação do meio ambiente.
- Produto tóxico para peixes e abelhas.
- Não guardar ou aplicar produto junto com alimentos, medicamentos, produtos de higiene, bebidas e utensílios domésticos.
- Não fumar, beber e se alimentar durante o manuseio e aplicação do produto.
- Utilizar luvas protetoras para administrar o produto.
- Evitar o contato do produto com pele, olhos e boca.
- Após a aplicação da coleira, remover as luvas e lavar bem as mãos.
- No caso de contato com pele, lavar o local imediatamente com água e sabão em abundância.
- No caso de contato direto com os olhos, lavar imediatamente com água corrente.
- Pessoas com sensibilidade conhecida aos ingredientes da coleira devem evitar o contato com o produto.

CONTRAINDICAÇÕES:

- **NÃO USAR A COLEIRA EM GATOS.**
- Não usar a coleira em cães com menos de 12 meses de idade.
- Não usar a coleira em fêmeas prenhes e lactantes.

REAÇÕES ADVERSAS:

Cães com histórico de hipersensibilidade poderão apresentar reações alérgicas cutâneas. Nestes casos, retirar a coleira e banhar o animal com água e sabão para remoção do produto e no caso da persistência dos sintomas, procurar o médico-veterinário, levando consigo a embalagem do produto.

ATENÇÃO: Este medicamento não é para uso humano.

GRUPO QUÍMICO DOS COMPONENTES ATIVOS:

Fenilpirazol (fipronil), piridinas (piriproxifeno) e piretróide sintético (permetrina).

APRESENTAÇÃO:

Para cães até 4 kg: coleira de 14 g com 38 cm de comprimento.

Para cães acima de 4 kg: coleira de 26 g com 70 cm de comprimento.

CUIDADO VENENO:

Em caso de intoxicação humana, procurar imediatamente assistência médica, levando consigo a embalagem do produto.



CONSERVAÇÃO:

O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, em local arejado, ao abrigo da luz e calor, em temperatura ambiente variando de 15 a 30°C e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Uma vez aberta a embalagem, a coleira deverá ser colocada no animal.

FABRICANTE E PROPRIETÁRIO:

VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL LTDA.

Rua 11, S/N, Qd.07, Lt.04.

Polo Empresarial Goiás.

Aparecida de Goiânia/GO.

CNPJ: 60.528.742/0003-88.

www.vetoquinol.com.br

faleconosco@vetoquinol.com

SAC: 0800 741 1005

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

Renata C. F. Soares.

CRF/GO n° 4.046.

Produto licenciado pelo MAPA desde 08/11/2018

Registrado sob o n° GO 001170-3.0000032



INDÚSTRIA BRASILEIRA